Séminaire CAML QCM nº 2 vendredi 12 septembre 2025

1. Quel sera le dernier résultat après évaluations successives des phrases suivantes?

- (a) : int = 8
- (b) -: int = 9
- (c) : int = 10
- (d) : int = 11/
- (e) Une erreur.
- 2. Que calcule la fonction suivante?

- (a) x^8
- (b) x^{10}
- (c) x^{12}
- (d) x^{16}
 - (e) x^{18}
- 3. Quel est le résultat de l'évaluation de la phrase suivante? let f x y z = let res = y + z in x = 'A' && res < (y * z);;</p>

- (b) val f : string -> int -> int -> bool = <fun>
- (c) val f : char -> int -> int -> bool = <fun>/
- (d) val f : int -> int -> char -> bool = <fun>
- (e) Une erreur.
- 4. Quel est le résultat de l'évaluation de la phrase suivante? let f x y = if x > y then x mod y else y mod x;;

```
(a) val f : int -> int -> int = <fun>/
```

- (b) val f : int -> int -> bool = <fun>
- (c) val f : int -> int -> float = <fun>
- (d) val f : float -> float -> float = <fun>
- (e) Une erreur.

5. Quel est le résultat de l'évaluation de la phrase suivante?

- (a) val f : int -> int -> int = <fun>
- (b) val f : int -> int -> bool = <fun>/
- (c) val f : int -> int -> bool = <fun>
 val g : int -> int = <fun>
- (d) val f : int -> int = <fun>
 val g : int -> int = <fun>
- (e) Une erreur.

6. Quel est le résultat de l'évaluation de la phrase suivante?

- (a) val f : char -> float -> string = <fun>
- (b) val f : char -> float -> string -> int = <fun>
- (c) val f : 'a -> int = <fun>
- (d) Une erreur. /

7. Quel est le résultat de l'évaluation de la phrase suivante?

- (a) val f : int -> int = <fun>
- (b) val f : float -> float = <fun>
- (c) val f : int -> float = <fun>
- (d) Une erreur.

8. Quel est le résultat de l'évaluation de la phrase suivante?

```
let f x y z =
              let v = (2 * x + 3 * y + 2 * z) / 7 in
               if x > v && y > v && z > v then
                 3
               else
                 if x > v \mid \mid y > v then
                 else
                   1;;
(a) val f : int -> int -> int -> int = <fun>
(b) val f : int -> int -> int -> int -> float -> int = <fun>
```

- (c) val f : int -> int -> int -> int -> int = <fun>
- (d) val f : int -> int -> int -> bool -> int = <fun>
- (e) Une erreur.
- 9. Quel sera le résultat de l'application de f (question précédente) aux valeurs 4, 6 et 8 (f 4 6 8)?
 - (a) : int = 3
 - (b) -: int = 2
 - (c) : int = 1
 - (d) Pas de résultat : la fonction est toujours incorrecte!
- 10. Que calcule la fonction suivante appliqué à trois valeurs entières?

- (a) La somme des carrés des deux plus grands
- (b) Le carré de la somme des deux plus grands
- (c) Le carré de la somme des deux plus petits /
- (d) La somme des carrés des deux plus petits
- (e) Rien, la fonction est incorrecte.

QCM 2

vendredi 12 septembre

Question 11

La négation de « $\forall x \in \mathbb{R}, x > 1 \implies 2x + 1 \ge 0$ » est

- a. $\forall x \in \mathbb{R}, x > 1 \text{ et } 2x + 1 \ge 0 \text{ }$
- b. $\forall \exists x \in \mathbb{R}, x \leq 1 \implies 2x + 1 < 0$
- c. $\forall \exists x \in \mathbb{R}, x > 1 \text{ et } 2x + 1 < 0 \text{ } \nearrow$
- d. $\forall \exists x \in \mathbb{R}, x > 1 \implies 2x + 1 < 0$
- e. Aucune des autres réponses

Question 12

Cochez la(les) bonne(s) réponse(s)

- a. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$
- b. $\exists x \in \mathbb{R}, e^x = -2$
- c. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, e^x = y /$
- d. $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, e^x = y$
- e. Aucune des autres réponses

Question 13

La contraposée de « Si le soleil brille alors il fait chaud » est

- a. « Le soleil brille et il ne fait pas chaud »
- b. « Si le soleil ne brille pas alors il ne fait pas chaud »
- c. « S'il fait froid alors le soleil ne brille pas »
- d. Aucune des autres réponses /

Question 14

On considère $E = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \exists \, x \in \mathbb{R}, f(x) > 0\}.$

- a. E est l'ensemble des fonctions réelles strictement positives
- b. E est l'ensemble des fonctions réelles ne s'annulant jamais
- c. Si $f: x \longmapsto x^2$ alors $f \in E$
- d. Si $f: x \longmapsto 1$ alors $f \in E \nearrow$
- e. Aucune des autres réponses

Question 15

Soit $E = \{1, 2, 3, 4\}$. Cochez la(les) réponse(s) correcte(s) et bien écrite(s).

- a. $(2,4) \subset E$
- b. $[2,3] \subset E$
- c. $\{1,4\} \in E$
- d. $1 \in E$
- e. Aucune des autres réponses

Question 16

Soient $E=\{n\in\mathbb{N}, 1\leq n\leq 20\}$ et F=[1,20]. On a

- a. $E \subset F$
- b. $F \subset E$
- c. F est un sous-ensemble de \mathbb{R}
- d. E est un sous-ensemble de N
- e. Aucune des autres réponses

Question 17

Soient $E = \{x \in \mathbb{R}, 0 \le x \le 5\}$ et F = [4, 9]. Cochez la(les) réponse(s) correcte(s) et convenablement écrite(s)

- a. $E \cap F = \{4 \le x \le 5\}$
- b. $E \cap F = 4 \le x \le 5$
- c. $E \cap F = [4, 5]$
- d. Aucune des autres réponses

Question 18

Soient $E =]0, +\infty[$ et $F = \mathbb{N}$. On a

a.
$$E \cup F = \mathbb{N}$$

b.
$$E \cup F = \{0\}$$

c.
$$E \cap F = \mathbb{N}^*$$

d.
$$E \cap F = \{0\}$$

e. Aucune des autres réponses

Question 19

Cochez la(les) bonne(s) réponse(s)

- a. Le domaine de définition de la fonction $x \mapsto \ln(x)$ est $]0,+\infty[$.
- b. Le domaine de définition de la fonction $x \mapsto \ln(x)$ est \mathbb{R} .

c.
$$\ln(1) = 0$$

d.
$$ln(2+3) = ln(2) + ln(3)$$

e. Aucune des autres réponses

Question 20

La fraction $F = \frac{\frac{9}{4}}{18}$ est égale à $\frac{1}{8}$

- a. Vrai X
- b. Faux